

Tarea 8

Ejercicio 24

Sea $\mathbf{a} \in \text{Mat}(m \times n, \mathbb{F})$ de rango r . Demuestra que entonces por medio de una sucesión de transformaciones de renglones \mathbf{a} se puede llevar a una matriz \mathbf{b} de la siguiente forma: Para una (única) sucesión de números naturales $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq n$ se tiene $b_{i,j_i} = 1$ para $i = 1, \dots, r$ y $b_{i,k} = 0$ en los siguientes casos: si $i > r$ o $k < j_i$ o ($k = j_s$ y $i < s$ para algún s). En particular, si $m = r = n$ se puede transformar \mathbf{a} por medio de transformaciones de renglones en la matriz unitaria.

Por ejemplo para $\text{Mat}(4 \times 6, \mathbb{F})$ y la sucesión $(1, 3, 5)$ la matriz \mathbf{b} sería de la siguiente forma:

$$\begin{pmatrix} 1 & * & 0 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 25

Sea $U_2 := \{\mathbf{u} \in \text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{C}) \mid \mathbf{u} \cdot \bar{\mathbf{u}}^t = \mathbf{e}\}$ donde

$$\bar{\mathbf{u}}^t := \begin{pmatrix} \bar{u}_{11} & \bar{u}_{21} \\ \bar{u}_{12} & \bar{u}_{22} \end{pmatrix} \text{ si } \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \text{ y } \mathbf{e} := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Demuestra:

- Si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U_2$ entonces $\mathbf{u} \cdot \bar{\mathbf{v}}^t \in U_2$ (esto significa que U_2 es un subgrupo de $\text{GL}_2(\mathbb{C})$).
- Sea $\mathbf{u} \in U_2$ y $\lambda \in \mathbb{C}$. Si $\det(\mathbf{u} - \lambda \mathbf{e}) = 0$ entonces $|\lambda| = 1$.

Ejercicio 26

Calcula la determinante de la siguiente matriz:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 7 & 10 \\ 9 & 10 & 11 & 13 \end{pmatrix}$$

Fecha de entrega: Jueves 20 de octubre antes de la clase.