Matemáticas Discretas I
Lista de ejercicios

Trimestre 2019I

Lee, piensa y responde con cuidado.

1. Comprueba las equivalencias siguientes.

(a) $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$

(d) $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

(b) $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$

(e) $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

(c) $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

(f) $P \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \Rightarrow Q)$

2. Da una demostración directa de las proposiciones siguientes.

(1) Para todo entero m , si m es par entonces $m + 7$ es impar.

(2) Para todos los enteros m y n , si mn es impar entonces m y n son los dos pares o los dos impares.

3. Da una demostración por reducción al absurdo de la siguiente proposición: Para cualquier entero n , si n^2 es impar entonces n es impar.

4. Dados tres conjuntos A , B y C , prueba las siguientes propiedades:

(a) $A \cap B = A$ si y sólo si $A \subseteq B$

(b) $A \setminus B \subseteq A$

(c) $A \setminus B = A$ si y sólo si $A \cap B = \emptyset$

5. ¿Cuáles de las proposiciones siguientes son verdaderas y cuáles falsas? Argumenta cada respuesta.

(a) $\emptyset \in \emptyset$.

(d) $\emptyset \subsetneq \emptyset$.

(g) $\emptyset \subsetneq \{\emptyset\}$.

(b) $\emptyset \notin \emptyset$.

(e) $\emptyset \in \{\emptyset\}$.

(h) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$.

(c) $\emptyset \subseteq \emptyset$.

(f) $\emptyset \notin \{\emptyset\}$.

(i) $\emptyset = \{\{\emptyset\}\}$.

6. Considera una función $f: A \rightarrow Y$ y conjuntos $A_1, A_2 \subseteq X$ y $B_1, B_2 \subseteq Y$. Prueba los siguientes enunciados.

(a) $f[A_1 \cup A_2] = f[A_1] \cup f[A_2]$

(b) Si $B_1 \subseteq B_2$ entonces $f^{-1}[B_1] \subseteq f^{-1}[B_2]$

(c) $f^{-1}[B_1 \cap B_2] = f^{-1}[B_1] \cap f^{-1}[B_2]$.

7. Sean $X = \{a, b, c, d\}$ y $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

(i) Da una función $f: X \rightarrow Y$ tal que $f[\{a, b, c\}] = \{2, 5\}$.

(ii) Da una función $g: X \rightarrow Y$ tal que $g^{-1}[\{1, 2, 5\}] = \{a, d\}$.

(iii) Da dos funciones $f_1, f_2: X \rightarrow Y$ tales que $f_1[\{a, b, c\}] = f_2[\{a, d\}]$.

(iv) Da dos funciones $g_1, g_2: X \rightarrow Y$ tales que $g_1^{-1}[\{1, 4, 5\}] = g_2^{-1}(3)$.

8. ¿Cómo se define *inyectiva*, *suprayectiva* y *biyectiva*?
9. Da un ejemplo de una función que no sea inyectiva ni suprayectiva, de una que sea inyectiva pero no suprayectiva y de una que sea suprayectiva pero no inyectiva.
10. Da dos funciones $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ y $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ que sean **biyectivas**.
11. Da una función $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ **que no sea suprayectiva pero sí inyectiva**.
12. Sea $X = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, da una función $f: X \rightarrow X$ que cumpla, simultáneamente, que:

$$f^{-1}[\{1, 2, 3\}] = \emptyset, f^{-1}[\{4, 5\}] = \{1, 3, 7\} \text{ y } f^{-1}[\{8, 10\}] = \{8, 10\}.$$

13. (a) Prueba por contrapositiva: Para todos los enteros positivos n, r y s , si $rs \leq n$ entonces $r \leq \sqrt{n}$ o $s \leq \sqrt{n}$.
- (b) Prueba: Para todos los enteros $n > 1$, si n no es primo entonces existe un número primo p tal que $p \leq \sqrt{n}$ y p divide a n .
- (c) Enuncia la contrapositiva del enunciado del inciso (b).

Así, tenemos lo siguiente.

Criterio de primalidad. *Dado un entero n con $n > 1$, para verificar si n es primo basta con ver si es divisible por un número primo menor o igual que su raíz cuadrada. Si no es divisible por ninguno de estos números entonces sí es un número primo.*

14. Usa el criterio de primalidad para determinar si los siguientes números son primos o no: 667, 557, 527 y 613.
15. ¿Cuántos ceros hay al final de $45^8 \cdot 88^5$? Explica cómo puedes responder esta pregunta sin calcular el número (*Sugerencia: $10 = 2 \cdot 5$*).
16. Si n es un entero y $n > 1$ entonces $n!$ es el producto de n y cada entero positivo menor que n . Por ejemplo $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.
- (a) Escribe $6!$ en la forma factorizada estándar.
- (b) Escribe $20!$ en la forma factorizada estándar.
- (c) Sin calcular el valor de $(20!)^2$, determina cuántos ceros hay al final de este número cuando lo escribamos en forma decimal. Justifica tu respuesta.
17. Prueba que todo entero n se puede escribir de alguna de las siguientes tres formas:

$$n = 3q, \quad n = 3q + 1 \quad \text{o} \quad n = 3q + 2,$$

para algún entero q .

18. Para todos los enteros m y n , prueba cada una de las afirmaciones siguientes.
- (a) Si $n \bmod 5 = 3$ entonces $n^2 \bmod 5 = 4$.
- (b) Si $m \bmod 5 = 2$ y $n \bmod 5 = 1$ entonces $mn \bmod 5 = 2$.
19. Dados tres enteros a, m y n con $0 \leq m \leq n$, prueba que $a^m \mid a^n$.
20. Prueba que cualesquiera dos enteros consecutivos tienen paridad diferente.
21. Consideremos el siguiente lema:

Lema. Si $a \geq b > 0$ entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a - b)$.

- (a) (20 puntos) Prueba el lema previo.
- (b) (5 puntos) Da la tabla de seguimiento del algoritmo 1 para $A = 630$ y $B = 336$.
- (c) (5 puntos) Da la tabla de seguimiento del algoritmo 1 para $A = 768$ y $B = 348$.

Algoritmo 1 Cálculo del mcd por medio de restas**Entrada:** A, B [enteros positivos]

- 1: [Dados dos enteros positivos A y B , las variables a y b se hacen igual a A y a B , respectivamente. Empezamos un proceso repetitivo; si $a \neq 0$ y $b \neq 0$ entonces el mayor entre a y b se hace igual a $a - b$ (si $a \geq b$) o a $b - a$ (si $a < b$) y el menor de a o b se deja sin cambio. Repetimos este proceso hasta que eventualmente a o b se hacen cero. Por el lema previo, después de cada repetición de este proceso tenemos que $\text{mcd}(A, B) = \text{mcd}(a, b)$. Después de la última repetición, tendremos que $\text{mcd}(A, B) = \text{mcd}(a, 0)$ o que $\text{mcd}(A, B) = \text{mcd}(0, b)$, dependiendo de cuál, entre a y b , es cero. Pero sabemos que $\text{mcd}(a, 0) = a$ o que $\text{mcd}(0, b) = b$. Por lo tanto, después de la última repetición, tendremos que $\text{mcd}(A, B) = a$ si $a \neq 0$ o $\text{mcd}(A, B) = b$ si $b \neq 0$.]
- 2: $a \leftarrow A, b \leftarrow B$
- 3: **mientras** $a \neq 0$ y $b \neq 0$
- 4: **si** $a \geq b$ **entonces**
- 5: $a \leftarrow a - b$
- 6: **sino** $b \leftarrow b - a$
- 7: **fin si**
- 8: **fin mientras**
- 9: **si** $a = 0$ **entonces**
- 10: $\text{mcd} \leftarrow b$
- 11: **sino** $\text{mcd} \leftarrow a$
- 12: **fin si**
- 13: [Después de la ejecución de la instrucción **si-entonces-sino**, $\text{mcd} = \text{mcd}(A, B)$.]

Salida: mcd [un entero positivo]

22. Considera $a = 25, b = 19$ y $n = 3$.
 - (a) Verifica que $3 \mid 25 - 19$.
 - (b) Explica por qué $25 \equiv 19 \pmod{3}$.
 - (c) ¿Qué valor de k satisface que $25 = 19 + 3k$?
 - (d) ¿Cuál es el residuo (no-negativo) que se obtiene al dividir 25 entre 3? ¿Y cuándo dividimos 19 entre 3?
 - (e) Explica por qué $25 \pmod{3} = 19 \pmod{3}$.
- Considera $a = 68, b = 33$ y $n = 7$.
 - (a) Verifica que $7 \mid 68 - 33$.
 - (b) Explica por qué $68 \equiv 33 \pmod{7}$.
 - (c) ¿Qué valor de k satisface que $68 = 33 + 7k$?
 - (d) ¿Cuál es el residuo (no-negativo) que se obtiene al dividir 68 entre 7? ¿Y cuándo dividimos 33 entre 7?
 - (e) Explica por qué $68 \pmod{7} = 33 \pmod{7}$.
23. Prueba la *simetría* de las congruencias modulares, es decir, prueba que cualesquiera tres enteros a, b, n , con $n > 1$, si $a \equiv b \pmod{n}$ entonces $b \equiv a \pmod{n}$.
24. Verifica las afirmaciones siguientes.

<ol style="list-style-type: none"> (a) $128 \equiv 2 \pmod{7}$ y $61 \equiv 5 \pmod{7}$ (b) $(128 + 61) \equiv (2 + 5) \pmod{7}$ (c) $(128 - 61) \equiv (2 - 5) \pmod{7}$ (d) $(128 \cdot 61) \equiv (2 \cdot 5) \pmod{7}$ (e) $128^2 \equiv 2^2 \pmod{7}$ 	<ol style="list-style-type: none"> (a) $45 \equiv 3 \pmod{6}$ y $104 \equiv 2 \pmod{6}$ (b) $(45 + 104) \equiv (3 + 2) \pmod{6}$ (c) $(45 - 104) \equiv (3 - 2) \pmod{6}$ (d) $(45 \cdot 104) \equiv (3 \cdot 2) \pmod{6}$ (e) $45^2 \equiv 3^2 \pmod{6}$
---	--
25. Considera cinco enteros a, b, c, d y n , con $n > 1$ y tales que $a \equiv c \pmod{n}$ y $b \equiv d \pmod{n}$, prueba las siguientes afirmaciones:

<ol style="list-style-type: none"> (a) $(a - b) \equiv (c - d) \pmod{n}$ 	<ol style="list-style-type: none"> (b) $a^2 \equiv c^2 \pmod{n}$
--	--
26.
 - (a) Prueba que para todo entero n , con $n \geq 0$, se tiene que $10^n \equiv 1 \pmod{9}$.
 - (b) Utiliza la parte previa para probar que un entero positivo es divisible entre 9 si y sólo si la suma de sus dígitos es divisible entre 9.

-
27. (a) Calcula $26^2 \pmod{55}$, $26^4 \pmod{55}$, $26^8 \pmod{55}$ y $26^{16} \pmod{55}$.
(b) Calcula $26^{27} \pmod{55}$.
28. Calcula $89^{307} \pmod{713}$ y $48^{307} \pmod{713}$.
29. Utiliza el algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor de las siguientes parejas de números y expresarlo como combinación lineal de los números.
- (a) 6664 y 765 (b) 4158 y 1568
30. (A) Encuentra un inverso para 210 módulo 13. (a) Encuentra un inverso para 41 módulo 660.
(B) Encuentra un inverso positivo para 210 módulo 13. (b) Encuentra una solución positiva para la congruencia $41x \equiv 125 \pmod{660}$
(C) Encuentra una solución positiva para la congruencia $210x \equiv 8 \pmod{13}$